Asmabec®

Clickhaler™

BÉCLOMÉTASONE DIPROPIONATE

100 µg/dose

Poudre pour inhalation

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que ASMABEC CLICKHALER 100 microgrammes/dose, poudre pour inhalation et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ASMABEC CLICKHALER 100 microgrammes/dose, poudre pour inhalation
3. Comment prendre ASMABEC CLICKHALER 100 microgrammes/dose, poudre pour inhalation
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver ASMABEC CLICKHALER 100 microgrammes/dose, poudre pour inhalation
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ASMABEC CLICKHALER 100 microgrammes/dose, poudre pour inhalation ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Classe pharmacothérapeutique : CORTICOÏDE PAR VOIE INHALEE

Ce médicament est un corticoïde qui s'administre par voie inhalée.

C'est un médicament anti-inflammatoire préconisé en traitement de fond continu et régulier de l'asthme.

Attention: ce médicament n'est pas un bronchodilatateur.
Il ne permet pas le traitement de la crise d'asthme.

Il n'apporte pas de soulagement immédiat. Il est en particulier sans action sur la crise d'asthme déclarée.

Son efficacité ne se manifeste qu'au bout de plusieurs jours et dépend du respect rigoureux de la posologie (dose et nombre de prises) prescrite par votre médecin et adaptée à votre cas.

Il ne doit pas être interrompu sans avis médical, même en cas d'amélioration très nette des symptômes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ASMABEC CLICKHALER 100 microgrammes/dose, poudre pour inhalation

N'utilisez jamais ASMABEC CLICKHALER 100 microgrammes/dose, poudre pour inhalation :
- en cas d'allergie à l'un des constituants de ce médicament.
- en cas de survenue de majoration de la gêne respiratoire à la suite de l'inhalation de ce produit, ne pas renouveler la prise de ce médicament, mais contacter votre médecin.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin.

Faites attention avec ASMABEC CLICKHALER 100 microgrammes/dose, poudre pour inhalation :

Ce produit, actif en inhalation doit atteindre l'extrémité des petites bronches. En cas d'encombrement des voies respiratoires (par des mucosités abondantes) ou d'infection, son efficacité peut être diminuée. Il convient de consulter rapidement votre médecin afin qu'il instaure un traitement adapté.

En cas de survenue de crises, ou de gêne respiratoire il faut utiliser un autre médicament "bronchodilatateur bêta2mimétique par voie inhalée à action rapide et de courte durée" que votre médecin vous aura prescrit à cet effet.

Le soulagement habituellement obtenu avec le bronchodilatateur bêta2mimétique par voie inhalée doit alors être observé rapidement. En cas d'échec, consulter immédiatement un médecin.

En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin.

Utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger du traitement le mieux adapté à votre cas.

Allaitement

Ce médicament peut être administré pendant l'allaitement.

Sportifs

L'attention des sportifs sera attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

Informations importantes concernant certains composants de ASMABEC CLICKHALER 100 microgrammes/dose, poudre pour inhalation : lactose.

3. COMMENT UTILISER ASMABEC CLICKHALER 100 microgrammes/dose, poudre pour inhalation

Posologie

La posologie est strictement individuelle et sera adaptée par votre médecin en fonction de la sévérité de votre asthme.

A titre indicatif, la dose quotidienne de ce médicament est:

Chez l'adulte: 2 à 20 inhalations par jour réparties en 2 à 4 prises par jour.

Chez l'enfant: 2 à 4 inhalations par jour réparties en 2 à 4 prises par jour. Cette dose peut être augmentée si les symptômes persistent.

Il existe des spécialités plus fortement dosées mieux adaptées pour l'administration des posologies les plus élevées. Elles devront être préférées dans ces cas.

Si la dose habituellement efficace de ce médicament devient insuffisante, si les crises ou les épisodes de gêne respiratoire deviennent plus fréquents, il faut craindre une aggravation de la maladie, consultez rapidement votre médecin qui réévaluera votre traitement.

Dans tous les cas se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

En cas de persistance des troubles, consulter impérativement votre médecin.

Mode d'administration

Inhalation par distributeur avec embout buccal.

Voie inhalée exclusivement.

Si vous avez l'impression que l'effet d'ASMABEC CLICKHALER 100 microgrammes/dose, poudre pour inhalation est trop fort ou trop faible. Consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez utilisé plus de ASMABEC CLICKHALER 100 microgrammes/dose, poudre pour inhalation que vous n'auriez dû :

Consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre ASMABEC CLICKHALER 100 microgrammes/dose, poudre pour inhalation:

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS

Comme tous les médicaments, ASMABEC CLICKHALER 100 microgrammes/dose, poudre pour inhalation est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Si vous êtes sensible à l'inhalation d'une poudre sèche, il peut occasionnellement apparaître une irritation de la gorge avec toux et enrouement, ceci peut être prévenu en se rinçant la bouche après inhalation du produit.

En cas de gêne persistante dans la bouche ou dans la gorge, avertir votre médecin, ne pas modifier ou arrêter le traitement sans son avis.

Une candidose buccale (muguet) peut parfois apparaître. Elle ne nécessite pas nécessairement un arrêt de ce traitement mais la mise en route d'un traitement spécifique. Elle peut être prévenue en se rinçant la bouche après inhalation du produit.

En cas de doute ne pas hésiter à prévenir votre médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER ASMABEC CLICKHALER 100 microgrammes/dose, poudre pour inhalation

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser ASMABEC CLICKHALER 100 microgrammes/dose, poudre pour inhalation après la date de péremption mentionnée sur la boîte

A utiliser dans les 6 mois après ouverture du sachet.

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C et à l'abri de l'humidité.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient ASMABEC CLICKHALER 100 microgrammes/dose, poudre pour inhalation

La substance active est :

Dipropionate de béclométasone .....100 microgrammes pour une dose mesurée de 2,6 mg

Les autres composants sont :

Lactose monohydraté (contenant des protéines de lait).

Qu'est ce que ASMABEC CLICKHALER 100 microgrammes/dose, poudre pour inhalation et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous la forme de poudre pour inhalation en flacon de 200 doses.

Titulaire

UCB Pharma S.A. 420, rue d'Estienne d'Orves, 92700 COLOMBES

Tél. : 01 47 29 44 35

Fabricant

RECIPHARM LIMITED

Vale of Bardsley, Ashton under Lyne, Lancashire OL7 9RR, ROYAUME-UNI

Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen sous les noms suivants :

Belgique : QVAR 100µG, QVAR 100µG AUTOHALER

Irlande : ASMABEC CLICKHALER 100 µG

Luxembourg : QVAR-100, QVAR-100 AUTOHALER

Royaume-Uni : ASMABEC CLICKHALER 100 µG

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est août 2008.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

ucb

Mode d'emploi du dispositif

L'efficacité de ce médicament est en partie dépendante du bon usage de l'appareil d'inhalation. Il convient de lire très attentivement la notice. Au besoin, n'hésitez pas à demander à votre médecin ou à votre pharmacien de vous fournir des explications détaillées.



1. **Retirer le capuchon** de l'embout buccal de l'inhalateur.



2. Secouer l'inhalateur.

3. Tenir l'inhalateur verticalement en tenant le pouce sur le fond et le doigt sur le bouton-poussoir. Appuyer fermement sur le bouton doseur **une seule fois**.



4. Expirer le plus profondément possible (ne jamais souffler dans l'appareil).



5. Mettre l'embout dans la bouche. Bien fermer les lèvres tout autour (ne pas mordre l'embout).

6. Inspirer régulièrement et profondément par la bouche pour aspirer le médicament dans les poumons.

7. Retenir sa respiration, retirer l'inhalateur de la bouche tout en continuant à retenir sa respiration pendant 5 secondes.

8. Renouveler éventuellement l'administration si besoin.

9. Replacer le capuchon sur l'embout buccal.

10. Se rincer la bouche après inhalation.

Instructions pour le nettoyage



1. Retirer le capuchon de l'embout de l'inhalateur.



2. Appuyer vers le bas sur l'extrémité de l'embout pour retirer l'embout.



3. Essuyer le corps de l'inhalateur avec un morceau de papier mousseline ou de tissu sec. Ne pas utiliser d'eau.



4. Essuyer l'embout avec un morceau de papier mousseline ou de tissu sec. Ne pas utiliser d'eau.



5. Remonter l'embout sur le corps de l'inhalateur puis remonter le capuchon sur l'embout.